

TUPROQ EROZIYASIGA QARSHI KURASH TADBIRLARI

Jumayeva Surayyo Baxtiyor qizi

Termiz davlat universiteti akademik litsey biologiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tuproq eroziyasi kelib chiqishi va unga qarshi kurash tadbirlari haqida so‘z brogan.

Kalit so‘zlar: Tuproqda eroziyaning paydo bolishi, tuproqning ustki qismini shamol va suv tasirida yuvilishi, tuproq eroziyasiga qarshi kurash uslublari

MEASURES TO COMBAT SOIL EROSION

Abstract: This article talks about the origin of soil erosion and measures to combat it.

Key words: Erosion in the soil, washing of the upper part of the soil by wind and water, methods of combating soil erosion

Tuproqda eroziyaning bo‘lishida qiyalikning uzunligi ham katta rol o‘ynaydi, chunki oqayotgan suv massasining ko‘payishi va uning tushish balandligi kattalanishi natijasida oqim tezligi va energiyasi kuchayadi. Bu yerda tuproqning yuvilishi qiyalikning tikligi bilan uzunligi bir vaqtda ta’sir qilganda keskin kuchayadi.

Qiyalikda tuproqning yuvilishini eroziya jarayonining o‘tishi bir qator omillar ta’sirida har xil darajada bo‘ladi. Ta’sir qiladigan omillar: tuproqning suv singdirish qobiliyati; yog‘ingarchilikning intensiv o‘tishi; o‘simplik qoplaming qalinligi. Masalan, qiyalikning tikkaligi butun uzunasi bo‘ylab o‘zgarmasa, yog‘inning intensivligi va tuproqning cuv singdirishi bir me’yorda davom etsa 500 metrli qiyalikning pastki qismida suvning to‘planishi boshlanish qismiga nisbatan taxminan besh barobarga ko‘payadi.

Qiyalik uzunligi bo'yicha ham tarkumlanadi: kalta – 100 m>, o'rta – 100 -200 m, uzun – 200 – 500 m, juda uzun – 500 m<.

Xo'jalik hududida har xil uzunlikdagi qiyalik mavjud bo'lsa uning tuproqda eroziya xavfini tug'dirish darajasini aniqlash uchun qiyalikning o'rtacha uzunligidan foydalilanadi, u quyidagicha aniqlanadi:

$$l_{cp.БЗБ} = \frac{l_1 S_1 + l_2 S_2 + \dots + l_n S_n}{100}$$

$l_{cp.БЗБ}$
 l_1, l_2, l_n
 S_1, S_2, S_n

(3)

Bu yerda:
– xo'jalik hududida qiyalikning o'rtacha og'irlilik uzunligi, m;
– uchastkalarda qiyalikning uzunligi, m;
– qiyaliklar bilan band bo'lgan maydon, %.

Qiyalikning qaysi qismida eroziya ko'proq xavli ekanligini aniqlash uchun uning uzunasi bo'ylab shakli (profil) ni bilish lozim. Joyda uchraydigan har xilshaklli qiyaliklarni asosan 4 guruhga birlashtirish mumkin: to'g'ri chiziqli; qubba (do'nglik); botiq; murakkab (pog'onali). S.S. Sobolev tomonidan o'z vaqtida (1948) yuqoridagi har bir guruhga kiritilgan qiyaliklarda eroziyaning o'tishi to'g'risida bat afsil ma'lumot berilgan (7-rasm). To'g'ri chiziqli shaklli qiyaliklar butun uzunasi bo'ylab taxminan bir xil tikligi bilan farqlanadi. Qiyalik yuzasi orqali o'tayotgan suv oqimining massasi uning pastki qismida ko'payadi, oqim esa tezlashadi, natijada tuproq yuvilishining kuchayishi uchun sharoit vujudga keladi.

Qubba shaklli qiyalikning pastki qismi katta tiklik (do'nhlik) dan iborat. Shuning uchun unda eroziya jarayoni kuchli o'tadi. Eroziyaning kuchli o'tishiga asosan ikkita omil bir vaqtda ta'sir qiladi: qiyalikning uzayishi va tiklikning kattalanishi.

Botiq shaklli qiyalikning yuqori qismida eroziya jarayoni kuchli o'tadi, pastga tomon borgan sari suv oqimi tezligi va eroziyaning o'tishi sekinlashadi, qiyalikning pastki qismida yuqori qismidan yuvilib kelgan tuproq zarrachalarining qatlami paydo

bo‘ladi. Qatlam qalinligi 50 sm va undan ortiq bo‘lishi mumkin. U quyidagicha turkumlanadi.: kuchsiz qatlam, qalinligi 20sm>, o‘rtacha qatlam, qalinligi 20 -40 sm, kuchli qatlam, qalinligi 40 sm<. (S.S.Sobolev).

Tuproqning ustki hosildor qismining suv va shamol ta’sirida yuvilib yoki uchirilib ketishiga tuprok eroziyasi deyiladi. Eroziya dehqonchilik uchun juda katta zarar keltiruvchi ofat hisoblanadi va lotincha "erosia" degan suzdan olingan bulib, "kemirish" yoki "emirish" degan ma’noni bildiradi.

Tuproq eroziyasi tabiiy va sun’iyga bulinadi. Tuproqni kishilarning xujalik faoliyati ta’sirisiz tabiiy holda eroziyaga uchrashi tabiiy eroziya deb, kishilarning ta’siri natijasida eroziyaga uchrashi sun’iy (antropogen) yoki tezlashtirilgan eroziya deb aytildi.

Tuproqning ustki unumdar (gumus) qatlami tabiiy va antropogen eroziya ta’sirida yuvilib va uchirib ketiladi. Natijada tuproq qashshoqlashib uning tarkibi buzilib, yaroqsiz yerlarga aylanib holadi. Eroziyaga uchragan tuproqda hosildorlik 5-10 marotaba kamayib, har xil begona utlar 2-4 marta kupayadi. SHu sababli dunyo buyicha eroziya natijasida yiliga (L. I. Kurakova ma’lumotiga kura) 1000 mlrd. dollar zarar kurilmoqda.

Tabiatda tuproqning tabiiy holda eroziyaga uchrash jarayonlari geologik eroziya deb yuritiladi. Geologik eroziya bu insonning ta’sirisiz ruy beradigan jarayon bulib, bu jarayon tuproq hosil bulish jarayoni tezligiga tengdir. Geologik eroziya yer evolyutsiyasining bir qismi hisoblanib, uni oldini olish mumkin emas. Chunki u butun geologik davrda davom etadi.

Geologik eroziya tektonik jarayonlar tufayli ruy beradi. Tektonik jarayonlar ta’sirida toglar kutariladi, muzlar harakat kiladi, daryo vodiylarida qator qayirlar vujudga keladi, transgressiya tufayli kup joylarni dengiz suvi bosadi. Vaqtning utishi bilan nurash tufayli baland toglar (Qozogiston past toglari) pasayadi, muz qaytadi, dengiz chekinadi, ular urnida asta-sekin tuproq vujudga kelib, usimliklar usadi,

tuproqning ustki qismida yana hosildor qatlam vujudga kela boshlaydi. Daryo vodiylarida esa qator qayirlar va deltalar shakllanadi.

Tuproqning sun'iy yoki tezlashtirilgan eroziyasi yer yuzida inson paydo bulgandan sung yerlardan notugri foydalanish tufayli ruy bera boshlagan. Tezlashtirilgan eroziya ta'sirida tuproqning ustki hosildor qismi deyarli uchirilib, yuvilib yuq qilinadi. Bu eroziya tabiiy geologik eroziyaga nisbatan ming marotaba tez ruy beradi.

Tezlashtirilgan eroziya dunyo buyicha dehqonchilik uchun ofat hisoblanadi. Chunki qisqa vaqt ichida bu eroziya ta'sirida millionlab hektar tuproqning ustki hosildor qismi yemirilib hosilsiz yerlarga aylanib holadi. Sunggi yuz yil ichida dunyoda 2 mld. ga hosildor tuproqlar eroziyaga uchrab ishdan chiqqan. Bu davr mobaynida tezlashtirilgan eroziya ayniqsa, rivojlangan mamlakatlarda tez sodir bulgan. Amerikalik olim T. Konke va A. Bertraning yozishicha, Amerika materigiga mustamlakachilar kelgandan buyon yerga nisbatan notutri munosabatda bulish tufayli, urmonlar kesilib, tuproq hosilsiz yerlarga aylantirib yuborilgan. Darhaqiqat, hozirgi vaqtda AQSHda eroziyaga qarshi choralar kurilishiga qaramay (L. I. Kurakova ma'lumotiga kura) 300 mln. hektardan kuproq yer tezlashtirilgan eroziyadan zarar kurgan. Shuning 110 mln. hektari haydaladigan yerlarga turri keladi. Hozir har yili AKTTTda ekin dalalari va yaylovlardan eroziya tufayli 2,7 mld. t Tuproqning Hosildor qismi yemirilib ketmoqda.

Tezlashtirilgan eroziya tropik rayonlarda urmonlarning rejasiz kesilishi oqibatida faol sodir bulmoqda.

Natijada, hozir Madagaskar oroli qududining 8/10 Qismi, Chili yerlarining 72% i eroziyaga uchragan. Eroziya tufayli Xitoyda 25% tuproqning hosildor qismi yuq bulgan. Dunyo buyicha tezlashtirilgan eroziya tufayli har kuni 3200 ga Hosildor yer ishdan chiqmoqda. Ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyoti natijasida ishdan chiqqan tuproq maydoni kun sayin ortib bormoqda.

Tezlashtirilgan eroziya hamdustlik davlatlari, jumladan, O‘zbekistonda ham ba’zan ilror agrotexnikaga qat’iy rioya qilinmagan hollarda, tuproqqa ishlov berish natijasida sodir bulmoqda. N. A.

Askochenskiyning hisobicha, sobiq ittifoq davlatlarida yuvilgan tuproq maydoni 60-80 mln. ga tashkil etib, jarlar hosil bulishi tufayli 4,5 mln. ga yer ishdan chiqqan. SHamol eroziyasiga uchragan maydon kulami 30-40 mln. getarga yetgan. Hamdustlik mamlakatlarida qishloq xujaligida foydalananadigan yer maydonining 9% i,

Eroziya jarayonini oldindan bashorat qilish uchun maxsus kuzatuvlar va tadqiqot ishlari amalga oshiriladi. Jumladan, suv eroziyasini bashorat qilishda yer ma’lum nishabliklarda sun’iy yomgir hosil qilinib, tuproq xususiyatlariga qarab qaysi bir yomgir jadalligida tuproqning yuvilishi, qaysi bir tuplangan suv oqimida chiziqli eroziyaning hosil bulishi aniqlanib, me’yorlar belgilanadi.

Er kurrasining sugorib dehqonchilik qilinadigan joylarida irrigatsiya eroziyasi ham mavjud. Irrigatsiya eroziyasi yerlarni notugri sugorish natijasida sodir bulib, kichik jarlar vujudga keladi va tuproq yuviladi. Agar sugorishning ilg‘or usullari qullanmasa tuproq yuvilib, dala etaklarida har xil chuqurlikda suv yuvib ketgan izlar (jarchalar) vujudga keladi.

O‘zbekistonning sugoriladigan rayonlarida 230-240 ming getarga yaqin tuproq irrigatsiya eroziyasiga duchor bulgan. Irrigatsiya eroziyasi tufayli tuproqning ustki hosildor qismi yuvilib, kam hosilli yerlarga aylanib holadi. Q. Mirzajonovning ma’lumotiga kura irrigatsiya eroziyasiga uchramagan normal buz tuproqli yerning gettaridan 30 ts paxta hosili olingan bulsa, yuvilgan buz tuproqda hosildorlik 25 tsentnerdan oshmagan.

Eroziya jarayonini oldindan bashorat qilish uchun maxsus kuzatuvlar va tadqiqot ishlari amalga oshiriladi. Jumladan, suv eroziyasini bashorat qilishda yer ma’lum nishabliklarda sun’iy yomgir hosil qilinib, tuproq xususiyatlariga qarab qaysi bir yomgir jadalligida tuproqning

yuvilishi, qaysi bir tuplangan suv oqimida chiziqli eroziyaning hosil bulishi aniqlanib, me'yorlar belgilanadi. haydaladigan yerlar maydonining 24% i eroziyaga duchor bulgan.

O'zbekiston Respublikasining tog‘ va tog‘ oldi rayonlari hududining 50% i sel eroziyasiga uchragan. Sug‘oriladigan zonada u yoki bu darajada eroziyaga uchragan tuproq maydoni 2,8 mln. ga.

tuproq eroziyasi natijasida yerlar kam hosilli yerlarga aylanib, qishloq xujalik oborotidan chiqib qoladi. SHuning uchun tuproqning tezlashtirilgan eroziyasi oldini olish va yerlarimizning hosildorligini oshirib borishimiz kerak. Chunki tuproq bu shunday tabiiy resurski, agar undan fan yutuqlariga asoslanib, ilg‘or agrotexnikani qo‘llab, to‘g‘ri, oqilona foydalanilsa, uning hosildorligi oshib boraveradi.

Yonbagirlari tik bulgan yerlarni notugri haydash suv eroziyasi jarayonini juda ham tezlashtiradi. Qiyaligi 2-3o bulgan yonbagirlarni buylamasiga haydash, qorlarning erishi va yomgirdan vujudga kelgan suv ta’sirida tuproq yuvilishiga sabab buladi. Shu sababli yonbagirlari Qiya bulgan yerlarni kundalangiga haydash va iloji boricha bu yerlarga bir yillik ekinlarni kam ekish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

- 1.Abdullaev O., Toshmatov Z., O‘zbekiston ekologiyasi bugun va ertaga. T. Fan, 1992 y.
- 2.Rafikov A.A., Geoekologik muammolar. T.Ukituvchi, 1997, 112b.
- 3.Otaboev Sh., Nabiev M. Inson va biosfera. T.Ukituvchi, 1995, 320 b.
- 4.Tuxtaev A.S. ekologiya. T.Ukituvchi, 1988, 192b.
- 5.Shodimetov Yu. Ijtimoiy ekologiyaga kirish. T.Ukituvchi, 1994.